

果菜類のコナジラミ密度低下に!!

ダブル



ベストマッチ!

W スロックス!!



アフアーム[®]
+
乳剤

「農家の常備薬」
接触毒・食毒効果




ムシラップ[®]

「ともち効果」
被膜効果による
物理的作用

アフアーム乳剤+ムシラップ混用試験

耕種概要

- ✓ 場所: JAやつしろ南部近辺
- ✓ 作物: トマト (桃太郎)
- ✓ 散布日: 2020年6月10日
- ✓ 発生程度: 多発生 (飛込みあり)
- ✓ 試験区: 1.75㎡/区
- ✓ 反復数: 2反復
- ✓ 散布方法: 背負動噴にて充分量
- ✓ 調査方法: 計30葉の成虫数を計数



ムシラップによる被膜効果で飛び込み成虫を補足し、アフアームとの相乗効果を発揮!

適用病害虫の範囲及び使用方法 (一部抜粋:2020年6月現在)



有効成分:エマメクチン安息香酸塩 1.0%

作物名	適用病害虫	希釈倍数	本剤の使用回数	使用時期	使用液量	使用方法
きゅうり	コナジラミ類, アザミウマ類 ハモグリバエ類, ウリノメイガ ハスモンヨトウ	2000倍	2回以内	収穫前日 まで	100~300L /10a	散布
すいか	コナジラミ類 アザミウマ類		3回以内			
メロン	コナジラミ類, ハモグリバエ類 ウリノメイガ	2000倍	2回以内			
	アザミウマ類	1000~2000倍				
トマト	コナジラミ類, トマトサビダニ ハモグリバエ類, オオタバコガ	2000倍	5回以内			
ミニトマト	コナジラミ類, トマトサビダニ ハモグリバエ類, オオタバコガ					
ピーマン	コナジラミ類, オオタバコガ		2回以内			
なす	コナジラミ類, アザミウマ類 ハダニ類, ハモグリバエ類 オオタバコガ, ハスモンヨトウ チャノホコリダニ					



有効成分:ソルビタン脂肪酸エステル 70.0%

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	本剤の使用回数	使用時期	使用液量	使用方法
野菜類	コナジラミ類, アブラムシ類 ハダニ類, うどんこ病	500倍	—	収穫前日 まで	100~300L /10a	散布

トマト: 上手な使用例



トマト黄化葉巻病の予防には・・・コナジラミを
ハウス外に出さない、ハウス内に入れない、**ハウス内で増やさない!!!**

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。